



PROPOSITION DE PRISE EN CHARGE ANTALGIQUE de l'IVG en période d'épidémie COVID-19

version du 23/04/2020

Place de l'IBUPROFÈNE en épidémie de COVID-19

- Hypothèse d'accidents graves de SDRA, y compris chez des jeunes, liés à la prise d'AINS
- PRINCIPE DE PRÉCAUTION : à partir du 26/03/2020
- Possible en périopératoire en l'absence de signes infectieux (à discuter au cas par cas)

SUPPRESSION de l'IBUPROFÈNE EN SYSTÉMATIQUE SUR LES ORDONNANCES

IVG MÉDICAMENTEUSE À DOMICILE

ORDONNANCE à remettre aux patientes

- ANTIÉMÉTIQUE
- PARACÉTAMOL 1 g + 2 ampoules de 20 mg de NÉFOPAM x 3/j QSP 48h
(à prendre dilué dans un peu d'eau sucrée)
- ou
- PARACÉTAMOL codéiné 1 g x 3/j QSP 48h

IVG MÉDICAMENTEUSE EN HOSPITALISATION

ADMINISTRER

- PARACÉTAMOL 1 g + IBUPROFÈNE 400 mg 30 minutes avant la prise du MISOPROSTOL
- Si signes infectieux ou CI, remplacer IBUPROFÈNE 400 mg par 2 ampoules de NÉFOPAM 20 mg per os (à prendre dans un peu d'eau sucrée)

ORDONNANCE de sortie

- PARACÉTAMOL 1 g + 2 ampoules de 20 mg de NÉFOPAM x 3/j QSP 48h
(à prendre dilué dans un peu d'eau sucrée)
- ou
- PARACÉTAMOL codéiné 1 g x 3/j QSP 48h

IVG INSTRUMENTALE

À L'ARRIVÉE

- prise de T° + interrogatoire sur signes cliniques COVID-19
- si préparation cervicale nécessaire avant le geste chirurgical, prévoir traitement antalgique 30 minutes avant la prise du MISOPROSTOL
- **En l'absence de signes suspects d'infection à COVID-19 chez une femme (sans comorbidité) pour le COVID-19 :**
=> donner IBUPROFÈNE 600 mg en prise unique + 2 ampoules de NÉFOPAM 20 mg

ORDONNANCE de sortie

- PARACÉTAMOL 1 g + 2 ampoules de 20 mg de NÉFOPAM x 3/j QSP 48h
(à prendre dilué dans un peu d'eau sucrée)
- ou
- PARACÉTAMOL codéiné 1g x 3/j QSP 48h