

FEUILLE D'INTRODUCTION DU TRAITEMENT PAR SULFATE DE MAGNESIUM

ETIQUETTE PATIENTE		DATE / HEURE :	
		MAR :	
		GO :	
Indication		Absence de contre-indications :	
<input type="checkbox"/> Fœtale <input type="checkbox"/> Maternelle : <input type="checkbox"/> Éclampsie <input type="checkbox"/> Menace d'éclampsie		<input type="checkbox"/> Absence de myasthénie ou de maladie neuromusculaire <input type="checkbox"/> Absence d'insuffisance rénale sévère (clairance <30mL/min)	
Conditions pré thérapeutiques		Traitement antihypertenseur associé :	
<input type="checkbox"/> Créatininémie <24H : <input type="checkbox"/> ECG <input type="checkbox"/> Scope et RCF <input type="checkbox"/> Gluconate de calcium disponible (1 ampoule de 10mL à 10%) <input type="checkbox"/> MAR et GO prévenus		<input type="checkbox"/> Uradipil (Eupressyl®) : IV ou PO <input type="checkbox"/> Labetalol (Trandate®) : IV ou PO <input type="checkbox"/> Nicardipine (Loxen®) : IV ou PO	
Personne(s) en charge de la surveillance :			

SIGNES CLINIQUES DE SURDOSAGE = FR<12 cycles/min, abolition ROT, hypotension artérielle, troubles de la conscience

ARRÊT DE LA SERINGUE MgSO₄ + APPEL MAR

FEUILLE DE SURVEILLANCE DU TRAITEMENT PAR SULFATE DE MAGNESIUM

	Avant traitement	0 min	15 min	30 min	45 min	1H	2H	3H	4H	5H	6H
Heure :											
ROT : 0 + ++											
FR											
PAS											
FC											
Effets indésirables bénins (flush, rougeur, nausée)											
Conscience : Normale Somnolente Coma											
Diurèse/H											
Dosage magnésémie (si réalisée)	NA										

NA : non adapté