Calendrier de suivi ambulatoire RPM

Patiente :
Date de la RPM :

Gynécologue Obstétricien référent hospitalier responsable du suivi : .....
Sage-femme référente du suivi à domicile : .....
Médecin traitant : .....

Suivi à domicile par la SF	**TA Pouls Température Par SF + Patiente**	**Enregistrement cardiotocographique fœtal**	**Écoulement LA :** Présence, aspect des pertes	**GB** Date prélèvement et résultat	**CRP** Date prélèvement et résultat	**PV** Date prélèvement et résultat	**ECBU** Date prélèvement et résultat
Suivi à domicile QUOTIDIEN par la SF les 15 premiers jours suivant la RPM							
Date	3 / jour	1 / jour	1 / jour	1 / semaine	1 / semaine	2 / semaine	2 / semaine

INFO PATIENTE : si vous ressentez de la fièvre ou des frissons, des contractions utérines qui se rapprochent ou s'intensifient, si vos pertes deviennent sales, si vous observez des saignements ou si votre bébé bouge moins, consulter sans délai aux urgences de la maternité.
Concernant le repos à domicile, il n'existe pas de recommandation qui impose un repos strict au lit, nous vous conseillons néanmoins de respecter une activité limitée, d'éviter la marche prolongée et les trajets en voiture. Les rapports sexuels sont déconseillés.

J15 : **RDV avec GO hospitalier référent** :

Échographie de contrôle (quantité de liquide amniotique déterminée par la Plus Grande Citerne) :

Suivi à domicile par la SF	**TA Pouls Température Par SF + Patiente**	**Enregistrement cardiotocographique fœtal**	**Écoulement LA :** Présence, aspect des pertes	**GB** Date prélèvement et résultat	**CRP** Date prélèvement et résultat	**PV** Date prélèvement et résultat	**ECBU** Date prélèvement et résultat
Suivi à domicile 3 fois par semaine par la SF + contrôle température/aspect LA par la patiente tous les jours							
Date	Prise de température quotidien par patiente, constantes mesurées par la SF lors de son passage	3 / semaine	Quotidien par patiente + lors du suivi SF à domicile	1 / semaine	1 / semaine	2 /semaine	2 / semaine

INFO PATIENTE : si vous ressentez de la fièvre ou des frissons, des contractions utérines qui se rapprochent ou s'intensifient, si vos pertes deviennent sales, si vous observez des saignements ou si votre bébé bouge moins, consulter sans délai aux urgences de la maternité.
Concernant le repos à domicile, il n'existe pas de recommandation qui impose un repos strict au lit, nous vous conseillons néanmoins de respecter une activité limitée, d'éviter la marche prolongée et les trajets en voiture. Les rapports sexuels sont déconseillés.