

Les troubles de l'oralité

Des difficultés alimentaires

Le trouble de l'oralité est un dysfonctionnement des fonctions de succion, de déglutition, ventilation, mastication,...

il peut être observé dès la naissance et dépisté à tout âge.

li manj pa in ta...
li manj rienk mixé!
li yèm pa brosse son dent
li yèm pa kan son min lé sal

li recrache!

li joué pa dann sab

Les origines

Traumatique

- Intubation
- Soins médicaux intrusifs

Digestif

- Atrésie de l'œsophage

Sensoriel

- Aversion à la vue des aliments
- Sensibilité au toucher

Neurologique

- Syndrome
- Maladie génétique

Respiratoire

- Stridor

Familial

- Antécédent de TOA «kan moïn lété peti»

Le rôle de l'orthophoniste dans le cadre d'un TOA



Réaliser un bilan orthophonique (entretien avec les parents, évaluation clinique,...), **faire le point** sur les expériences sensorielles et observer le comportement alimentaire.



Poser le diagnostic d'un trouble de l'oralité alimentaire (TOA) en lien avec les causes repérées.



Mettre en place un suivi orthophonique.



Travailler en lien avec d'autres professionnels de santé.

Une prise en soins pluridisciplinaire dès la naissance peut éviter l'aggravation et l'installation d'un trouble majeur de l'oralité



Quelques repères

ALIMENTATION DU NOURISSON

- **alimentation** au sein / biberon / mixte
- **succion** efficace



ALIMENTATION DIVERSIFIÉE entre 4 et 6 mois

- **exploration buccale** (objet, main, doudou)
- **comportement au moment du repas** : demande, touche, goûte, joue avec les aliments
- **intérêt et plaisir** au moment du repas
- **passage des textures** lisses aux morceaux

ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT

- **palette alimentaire variée** (légumes, fruits, féculents, protéines)
- **mastication efficace** (aliments solides : viande, pain dur,...)



Les signes d'alerte !!!



- **in utero pendant la grossesse** : présence d'un **hydramnios** (excès du liquide amniotique)
- **à la naissance** : difficulté de succion, reflux, hauts le coeur, vomissements, petit mangeur
- **développement psycho-moteur et sensoriel** : peu d'exploration, porte peu d'objets à la bouche, pleure et n'accepte pas de toucher différentes textures
- **âge de diversification alimentaire** : difficulté dans le passage d'une texture à l'autre, refus de manger, sélectivité, forcing, recours au chantage
- **Durée du repas** : supérieur à 20 min

